

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Edition
Grandes Cultures

REGION CENTRE

BULLETIN TECHNIQUE N° 30

8 NOVEMBRE 1990

CEREALES : Pucerons : continuez la surveillance en particulier sur la première vague de semis.
Cicadelles : encore des captures malgré les températures fraîches.
Zabres : nouveaux secteurs touchés.
SCLEROTINIA DU TREFLE : Premières apothécies.

- TREFLE-VIOLET -**SCLEROTINIA DU TREFLE :**

Le réseau de placettes à *Sclerotinia trifoliorum* spécifique des trèfles violet et incarnat, mis en place en coordination avec la FNAMS au moment des semis de fin d'été, montre l'apparition d'apothécies depuis le 1er Novembre (secteur de St Michel de Volangis -18-, Velles, Villesaubeon, Maron, Giroux, Villidieu -36-, Pontlevoy -41-). Dans le Nord du Loiret Huisseau S/Mauves, les stipes sont sortis et les premières apothécies ne sauraient tarder.

Les risques sont importants lorsque les trèfles entrent régulièrement dans l'assolement, après ancienne culture de trèfle violet, incarnat, blanc ou prairie surtout si des attaques plus ou moins sérieuses ont été observées.

La première intervention fongicide, au moment de l'apparition des apothécies est la plus performante. On pourra traiter avec carbendazime (1 l ou kg de PC) par température élevée si possible, au moins vers 15° C ou encore avec SUMISCLEX 1,5 kg, KONKER 1,5 kg, RONILAN 1,5 kg pour les situations à risques élevées.

Plus tard, une nouvelle intervention pourra être envisagée suivant l'évolution climatique.

- CEREALES -**PUCERONS :**

Situation : Soyez vigilants pour les parcelles actuellement au stade "2-3 feuilles". Observez les pucerons aux heures les plus chaudes de la journée. En effet, ces insectes sont difficilement visibles quand il fait froid et peuvent se cacher dans les gaines des feuilles et même au sol.

Préconisation : Les parcelles d'escourgeon qui n'ont pas encore reçu de traitement insecticide doivent être impérativement protégées. Un renouvellement peut être justifié sur les parcelles déjà traitées si l'on dénombre à nouveau 10 % de pieds porteurs de pucerons. Réalisez un comptage sur tous les blés qui n'ont pas encore reçu de traitement. Les dernières levées (à partir du 28 Octobre) sont beaucoup moins exposées car les captures d'ailés à la tour à succion restent quasiment nulle (1 seul *Rhopalosiphum padi* le 1er Novembre).

CICADELLES :

Situation : Les résultats des derniers piégeages montrent encore une activité de ce ravageur malgré les températures plus fraîches. Les parcelles abritées sont davantage exposées (les parcelles d'Eure et Loir en Beauce) ne présentent pratiquement plus de captures (voir tableau). Le redoux annoncé pour la fin de la semaine pourra provoquer un regain d'activité.

Préconisation : Attention aux semis effectués avant le 15 Octobre dans les secteurs où l'on piège encore des cicadelles. Sur toutes les parcelles de blé de ces secteurs qui n'ont pas encore reçu d'insecticide (envers le puceron ou les cicadelles), il est préférable d'intervenir avec une pyrèthrine autorisée (DECIS 0,3 l ou KARATE 0,15 l), la dose puceron est suffisante.

Publication périodique

ABONNEMENT ANNUEL : 190 F

Ministère de l'Agriculture et de la Forêt
 Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
 SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
 BP 210 - 93, rue de Curambourg
 45403 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
 Tél. 38.86.36.24



P55



EURE ET LOIR	MONTIGNY			BONNEVAL			CHARTRES			BROU		
	19-25	26-31	01-07	19-25	26-31	01-07	19-25	26-31	01-07	19-25	26-31	01-07
Nombre total de cicadelles	143	1	12	143	12	20	17	2	8	12	3	1
dont :												
* genre Psammotettix	13	1	1	72	12	7	0	0	0	8	3	0
- femelles	9	0	0	11	4	2	0	0	0	4	0	
- mâles	4	1	1	61	8	5	0	0	0	4	3	
dont . P. alienus	3	0	1	53	7	2	0	0	0	4	3	
. P. confinis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
. P. striatus	1	1	0	6	1	3	0	0	0	0	0	

LOIRET	SELLE S/BIED			CHANTECOQ			FLEURY		VENNECY		CRAVANT	CHATIL. COLIGNY	GIEN
	19-26	26-31	01-06	19-26	26-31	01-07	22-30	31-06	22-30	31-06	01-06	01-06	01-06
Nombre total de cicadelles	114	5	12	11	1	4	22	42	2	5	0	0	11
dont :													
* genre Psammotettix	13	2	10	9	0	4	8	10	2	3			10
- femelles			8	8	0	3	1	0	0	3			5
- mâles			2	1	0	1	7	10	2	0			5
dont . P. alienus				1	0		0	3	1				5
. P. confinis				0	0		6	6	0				
. P. striatus				0	0		1	1	1				

LOIR - ET - CHER	PERIGNY		ST OUEN		MOISSY		ST LEONARD		CHAMPIGNY		CROSSES		SOYE EN SEP	
	22-29	30-05	22-29	30-05	22-29	30-05	18-29	30-05	22-29	30-05	21-28	29-04	21-28	29-04
Nombre total de cicadelles	33	7	22	25	31	8	2	56	5	2	20	0	43	0
dont :														
* genre Psammotettix	20	2	14	10	13	1	2	38	1	1	3		10	
- femelles		1		1		0		21			0		4	
- mâles		1		9		1		17			3		6	
dont . P. alienus		1		7				16			3		6	
. P. confinis		0		1				0			0		0	
. P. striatus		0		1				1			0		0	

Quelques éléments sur une petite partie du réseau de piégeage Cicadelle du Cher et de L'indre. Ces informations concernent des parcelles non traitées et sont données par l'UNION du Cher.

DATES	NOMBRE DE CICADELLES PIEGEES DANS LE CHER											
	ST PALAIS	MEHUN	CERBOIS	PRIMELLES	ST JEANVRIN	BRUERE	BLET	BAUGY	RIANS (1)	RIANS (2)	VINON	MENETOU RATEL
16/10	12	-	21	-	-	3	44	-	9	18	19	-
22/10	22	6	13	1	0	0	22	18	4	5	16	25
29/10	0	13	4	2	0	0	9	10	0	0	7	10
05/11	0	0	0	1	0	4	8	2	1	1	1	1

INDRE	AVAIL			REBOURSIN		
	22/10	29/10	05/11	22/10	29/10	05/11
Nombre Cicadelles	6	5	1	12	6	1

ZABRE :

Des dégâts sont signalés dans de nouveaux secteurs (Buzançais -36-, Ouzouer le Marché -45-). Une pyrèthrinoïde à la dose d'homologation pucerons présente aussi une bonne efficacité si l'application a lieu le soir pour toucher les zabres en pleine activité.

Attention : les larves sont jeunes et d'autres éclosions peuvent avoir lieu. Aussi, si de nouveaux dégâts sont observés, l'efficacité du traitement n'est pas à mettre en cause.